



Comment ce médicament agit-il ?

L'abacavir est un médicament antirétroviral (anti-VIH). Il agit en empêchant la multiplication du VIH (VIH = virus de l'immunodéficience humaine).

L'abacavir est utilisé avec d'autres antirétroviraux afin de ralentir la progression de la maladie. Il aide à garder votre système de défense efficace et diminue le risque de développer des infections qui apparaissent lorsque le système de défense est faible (infections opportunistes).

L'abacavir ne guérit pas le sida et n'élimine pas le virus. Vous risquez toujours de transmettre le VIH, soit par contact sexuel ou par contact avec le sang. Vous devez donc continuer de prendre les précautions nécessaires (utiliser le condom, ne pas partager les seringues).



J'ai oublié de prendre une dose !

Prenez la dose oubliée dès que possible et continuez votre traitement selon l'horaire prévu.



Mais, s'il est presque temps de prendre votre prochaine dose, laissez tomber la dose manquée et continuez selon l'horaire prévu. **Ne doublez pas la dose.**

Arrêt de l'abacavir

Si vous arrêtez par vous-même l'abacavir en raison d'effets indésirables ou d'une maladie, consultez votre médecin avant de le reprendre. Le médecin s'assurera qu'il ne s'agissait pas de symptômes évoquant une réaction d'hypersensibilité.

Mélange de médicaments !

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre tout nouveau médicament, produit naturel ou drogue à usage récréatif.



Est-ce que je peux prendre de l'alcool ou des drogues avec l'abacavir ?

L'alcool peut augmenter les effets de l'abacavir. Évitez la consommation régulière d'alcool qui peut endommager votre foie, surtout si vous êtes porteur de l'hépatite. Une consommation raisonnable ne devrait pas nuire à votre santé.

Cependant, évitez de "sauter" une dose de médicament parce que vous consommez de l'alcool ou de la drogue.



Grossesse et allaitement

On ne connaît pas encore les effets de l'abacavir chez la femme enceinte. Discutez-en avec votre médecin si vous voulez prendre l'abacavir et que vous êtes enceinte ou désirez l'être.

L'allaitement n'est pas recommandé chez la femme infectée par le VIH.



Comment prendre ce médicament ?

ABACAVIR

___ comprimé à 300 mg

ou ___ mL (20 mg/mL)

___ fois par jour

L'abacavir peut être pris avec ou sans nourriture.

Il est important de bien prendre la thérapie sans oublier de dose. Sinon, le virus peut développer une **résistance**. Le médicament perdra son effet sur le virus et le traitement ne sera plus efficace.

À moins d'effets indésirables graves (voir section **effets indésirables**), *n'arrêtez jamais de prendre un ou plusieurs de vos médicaments sans en parler d'abord à votre médecin.*



Quels sont les effets indésirables ?

L'abacavir est généralement bien toléré. Au début du traitement vous pouvez ressentir des malaises tel que des maux de tête, de la fatigue et des nausées.

<p>Voyez IMMÉDIATEMENT votre médecin.</p> <p>Le médecin peut devoir arrêter définitivement l'abacavir.</p> <p>Ne jamais le reprendre par la suite, ni aucun autre médicament contenant l'abacavir (ex.: Trizivir^{MC}, Kivexa^{MD}).</p>	<p>Rash (rougeur sur la peau) seul ou symptômes dans au moins 2 des groupes suivant:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) fièvre 2) nausées, vomissements, diarrhée, douleurs abdominales 3) grande fatigue, malaise général 4) mal de gorge, essoufflement, toux <p>Acidose lactique : douleur à l'estomac accompagnée de nausées et de vomissements, douleurs musculaires, faiblesse ou grande fatigue, rythme cardiaque rapide ou irrégulier</p>
--	--

Avisez votre médecin et votre pharmacien de tout effet indésirable qui vous incommodent. Ils pourront vous conseiller afin de les gérer.

Où et comment garder l'abacavir ?

Pas dans la salle de bain.

Conservez l'abacavir dans un endroit sec et à la température de la pièce.

Garder hors de la portée des enfants.



Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe soignante afin que l'on puisse suivre votre état de santé même si vous n'avez pas de symptôme.

Si vous avez le doute de faire une réaction d'hypersensibilité à l'abacavir, consultez votre médecin.

