

Infection au VIH
Guide Thérapeutique
www.jag.on.ca/hiv

CLOTRIMAZOLE (CANESTEN^{MD})

Comprimé ou ovule à 200 mg



Comment ce médicament agit-il ?



Le clotrimazole est utilisé pour le traitement et la prévention des infections à champignons (infection fongique) de la bouche et de la gorge.

Comment prendre ce médicament ?

Votre posologie

Clotrimazole

_____ comprimé(s) à 200 mg

_____ fois par jour

Sortez l'ovule de clotrimazole de son emballage. Même si le médicament est appelé «ovule vaginal», il peut se prendre par la bouche : laissez-le fondre entièrement.

Évitez de boire ou de manger dans les 30 minutes (idéalement 60 minutes) suivant la prise du clotrimazole. Ceci permettra au médicament de rester en contact plus longtemps avec l'intérieur de votre bouche et son efficacité sera ainsi augmentée.

Il est important de prendre le clotrimazole de façon régulière, aux mêmes heures chaque jour et pour toute la durée du traitement, même si vous vous sentez mieux après quelque temps.

N'arrêtez jamais votre traitement sans d'abord en parler à votre médecin.



J'ai oublié de prendre une dose !

Prenez la dose oubliée dès que possible et poursuivez votre traitement selon l'horaire prévu.

Cependant, s'il est presque temps de prendre votre prochaine dose, prenez seulement cette dose selon l'horaire prévu. Ne doublez pas la dose.

Quels sont les effets indésirables de ce médicament ?



Le clotrimazole est généralement bien toléré.

Certaines personnes peuvent présenter des effets gastro-intestinaux (digestifs) tels que de la diarrhée, des douleurs abdominales, des nausées et des vomissements. Si ceux-ci se manifestent et persistent, consultez votre pharmacien, votre médecin ou votre diététiste, afin de trouver des solutions visant à gérer ces effets indésirables.

Parfois, on peut observer une dysgueusie (mauvais goût dans la bouche). En présence d'un mauvais goût dans la bouche, prenez des bonbons durs non sucrés ou de la gomme à mâcher sans sucre. Toutefois, avant de prendre un bonbon ou de la gomme, attendez au moins 30 minutes (idéalement 60 minutes) afin que le clotrimazole exerce son action.



Est-ce que je peux prendre de l'alcool avec le clotrimazole ?

Évitez la consommation excessive ou régulière de boissons alcoolisées (bière, vin et spiritueux) qui peut interagir avec certains de vos médicaments.

Cependant, évitez de «sauter» une dose de votre médicament parce que vous désirez prendre un boisson alcoolisée. À moins d'avis contraire de votre médecin, une consommation raisonnable (sociale) ne devrait pas nuire à votre état de santé.

Mode de conservation


Conservez le clotrimazole dans un endroit sec, à la température ambiante (15 à 30°C ou 59 à 86°F). Évitez les endroits humides tels que la salle de bains.



Gardez hors de la vue et de la portée des enfants.

Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe traitante ; ils pourront ainsi suivre étroitement votre état de santé.



Si vous avez des questions à propos de vos médicaments ou si vous désirez de l'aide afin de planifier la prise de vos médicaments, n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien ou à votre médecin qui connaît bien votre médication.

Personne ressource : _____

Téléphone : _____