

EPCLUSA (VELPATASVIR | SOFOSBUVIR)

Comprimé à 100/400 mg



Comment ce médicament agit-il ?

Epclusa est une combinaison de deux médicaments, soient velpatasvir et sofosbuvir, indiqué pour le traitement de l'infection causée par le virus de l'hépatite C (VHC).

Epclusa bloque plusieurs étapes du processus de réplication du virus. Ceci empêche la multiplication du virus dans le but de favoriser la guérison.

Comment prendre ce médicament ?

Epclusa

□ 1 comprimé **1 fois** par jour

Ce médicament peut être pris **avec ou sans nourriture**.

Il est important de prendre Epclusa de façon régulière, aux mêmes heures chaque jour et ce, pour toute la durée du traitement.

La durée est de 12 semaines. Si vous oubliez des doses, cela pourrait compromettre la réussite du traitement et diminuer vos chances de guérir. De plus, le virus responsable de votre hépatite pourrait devenir résistant et rendre les médicaments moins efficaces ou même inutiles.

Est-ce que je peux prendre Epclusa avec mes autres médicaments ?

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un nouveau médicament sur ordonnance (prescription), un médicament en vente libre, un produit naturel ou même une drogue à usage récréatif.

Informez particulièrement votre professionnel de la santé si vous prenez ce qui suit :

- Antiacides ou médicaments pour les brûlements d'estomac et le reflux, comme hydroxyde de magnésium (Maalox, Gaviscon) ranitidine (Zantac), famotidine (Pepcid), nizatidine (Axid), oméprazole (Losec, Olex), Pantoprazole (Pantoloc), Esoméprazole (Nexium, Vimovo), Lansoprazole (Prevacid), Dexlansoprazole (Dexilant), rabéprazole (Pariet)

- Médicaments pour prévenir les crises convulsives, comme carbamazépine (Tégréto), oxcarbazépine (Trileptal), phénytoïne (Dilantin), phénobarbital (Phenobarb)
- Médicaments pour le traitement de la tuberculose, comme rifampine, rifabutine (Mycobutin)
- Médicaments pour abaisser le taux de cholestérol, comme rosuvastatine (Crestor) et atorvastatine (Lipitor)
- Médicaments contre l'infection par le VIH : médicaments contenant du ténofovir DF (Truvada, Viread, Complera, Stribild, Atripla, Genvoya), éfavirine (Intelence)
- Médicaments pour contrôler le rythme cardiaque, comme la digoxine (Toloxin), amiodarone (Cordarone)
- Produit naturel : Millepertuis (St John's wort)


Est-ce que je peux prendre de l'alcool avec Epclusa ?

Idéalement, l'abstinence d'alcool (bière, vin et spiritueux) est fortement recommandée pour la population infectée par le VHC afin de protéger le foie.

Grossesse et allaitement

On ne connaît pas encore les effets du velpatasvir et du sofosbuvir chez la femme enceinte.

Discutez-en avec votre médecin si vous voulez commencer un traitement contre le virus de l'hépatite C et que vous êtes enceinte ou désirez l'être.



La présence du velpatasvir, du sofosbuvir et de leurs métabolites dans le lait maternel est toujours inconnue. L'allaitement est donc déconseillé pendant le traitement d'Epclusa.



Quels sont les effets indésirables de ces médicaments ?

C'est un médicament qui est bien toléré, les effets indésirables observés d'Epclusa sont d'intensité légère et ne nécessitent généralement pas l'arrêt du traitement.



Ils comprennent entre autres :

- Maux de tête
- Fatigue
- Vomissements

Les vomissements sont peu fréquents. Par contre, si vous avez des vomissements :

- Moins de 5 heures après la prise d'Epclusa, il faut reprendre une autre dose.
- Plus de 5 heures après la prise d'Epclusa, il faut reprendre la dose suivante au moment prévu initialement

Avisez votre médecin et votre pharmacien de tout effet indésirable qui vous incommoder ou qui persiste. Ils pourront vous conseiller afin de les gérer.

À moins d'une possibilité d'effets indésirables graves, n'arrêtez jamais votre traitement sans d'abord en parler à votre médecin ou à votre pharmacien.

J'ai oublié de prendre une dose !



Si moins de 18h après l'heure prévue :

Prenez la dose oubliée dès que possible et ensuite poursuivez votre traitement selon l'horaire prévu.

Si plus de 18h après l'heure prévue :

Laissez tomber la dose manquée et prenez seulement la prochaine dose selon l'horaire prévu.

Ne doublez pas la dose.

Mode de conservation

Conservez les comprimés d'Epclusa dans un endroit sec, à la température ambiante (15 à 30°C ou 59 à 86°F). Évitez les endroits humides tels que la salle de bain.



Gardez ce médicament dans son contenant original. Tenez hors de portée et hors de vue des enfants.

Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe traitante; ils pourront ainsi suivre étroitement votre état de santé.

Si vous avez des questions à propos de vos médicaments ou si vous désirez de l'aide afin de planifier la prise de vos médicaments, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien qui connaît bien votre médication.

Personne ressource : _____

Téléphone : _____