



# Ombistavir | Paritaprévir | Ritonavir | Dasabuvir (Holkira Pak<sup>MC</sup>) Comprimé à 12,5/50/75/250 mg



## Comment ce médicament agit-il ?

Holkira Pak<sup>MC</sup> est une association de plusieurs agents antiviraux qui agissent ensemble pour traiter l'infection causée par le virus de l'hépatite C (VHC).

Ce médicament bloque plusieurs étapes de la multiplication du virus et favorise la guérison. Il peut être prescrit seul ou en association avec d'autres médicaments selon le diagnostic de votre médecin.

La durée du traitement peut varier de 12 à 24 semaines en fonction :

- Du type du virus
- De votre condition hépatique
- De la réponse à un traitement antérieur

## ● Comment prendre ce médicament ?

Holkira Pak<sup>MC</sup> se présente dans un emballage spécifique qui vous indique à quel moment de la journée vous devez prendre les différents comprimés. Il vous suffira de suivre les instructions inscrites sur cet emballage pour prendre ce médicament.

Holkira Pak<sup>MC</sup> contient 2 types de comprimés différents : Ce médicament doit être pris avec de la nourriture. Le type d'aliments n'a pas d'importance.

Ombistavir/ Paritaprévir/ Ritonavir	Dasabuvir
<ul style="list-style-type: none"><li>• un (1) comprimé rose dosé à 12,5/75/50 mg</li><li>• une fois par jour le matin au déjeuner.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• un (1) comprimé beige dosé à 250 mg</li><li>• 2 fois par jour au déjeuner et au souper.</li></ul>

Il est important de prendre votre médicament de façon régulière, aux mêmes heures chaque jour et ce, pour toute la durée du traitement. Si vous oubliez des doses, cela pourrait compromettre la réussite du traitement et diminuer vos chances de guérir. De plus, le virus responsable de votre hépatite pourrait devenir résistant et rendre les médicaments moins efficaces ou même inutiles.

## ● Est-ce que je peux prendre Holkira Pak<sup>MC</sup> avec mes autres médicaments ?

Holkira Pak<sup>MC</sup> interagit avec de nombreux médicaments. Il est important de signaler à votre professionnel de santé tout médicament que vous prenez, sur une base régulière ou même occasionnellement.

Les médicaments suivants ne doivent pas être prescrits avec Holkira Pak<sup>MC</sup>. Ne prenez pas Holkira Pak<sup>MC</sup> et informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez l'un ou plusieurs de ces médicaments :

- Médicaments pour les problèmes urinaires : alfuzosine (Xatral<sup>MC</sup>)
- Anti-convulsivants : carbamazépine (Tegreto<sup>MC</sup>), phénytoïne (Dilantin<sup>MC</sup>), phénobarbital (Phénobarb<sup>MC</sup>)
- Médicaments contre le cholestérol : gemfibrozil (Lopid<sup>MC</sup>), lovastatine (Mevacor<sup>MC</sup>), simvastatine (Zocor<sup>MC</sup>)
- Médicaments anti-tuberculeux : rifampine
- Antirétroviraux contre l'infection par le VIH : éfavirenz (Atripla<sup>MC</sup>, Sustiva<sup>MC</sup>), rilpivirine (Complera<sup>MC</sup>, Edurant<sup>MC</sup>)
- Médicaments pour l'insomnie ou avant une intervention médicale : midazolam (Versed<sup>MC</sup>), triazolam (Halcion<sup>MC</sup>)
- Médicament pour l'hypertension pulmonaire : Bosentan (Tracleer<sup>MC</sup>)
- Médicaments utilisés pour les migraines appelés dérivés de l'ergot : ergotamine (Ergomar<sup>MC</sup>), dihydroergotamine (Migranal<sup>MC</sup>)



- Produits naturels : millepertuis (St. John's wort)
- Contraceptifs contenant de l'éthinylestradiol (comprimés, timbres ou anneaux vaginaux)
- Médicaments en pompe pour des problèmes respiratoires : salmétérol (Serevent<sup>MC</sup>, Advair<sup>MC</sup>)
- Médicaments en pompe contenant des corticostéroïdes pour problème respiratoire : fluticasone (Flovent<sup>MC</sup>, Avamys<sup>MC</sup> Advair<sup>MC</sup>, Flonase<sup>MC</sup>, Dymista<sup>MC</sup>), mométasone (Asmanex<sup>MC</sup>, Zenhale<sup>MC</sup>, Nasonex<sup>MC</sup>), budésonide (Symbicort<sup>MC</sup>, Rhinocort<sup>MC</sup>, Pulmicort<sup>MC</sup>)
- Médicament pour prévenir la somnolence (narcolepsie) : modafinil (Alertec<sup>MC</sup>).

D'autres médicaments qui n'apparaissent pas dans cette liste peuvent nécessiter un ajustement de dose lorsqu'ils sont administrés avec **Holkira Pak<sup>MC</sup>**. Par précaution, il est toujours préférable de consulter votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un nouveau médicament sur ordonnance (prescription), un médicament en vente libre, un produit naturel ou même une drogue à usage récréatif.

## ● Quels sont les effets indésirables de ce médicament ?

C'est un médicament qui est bien toléré en général, les effets indésirables principaux observés du **Holkira Pak<sup>MC</sup>** sont d'intensité légère et ne nécessitent pas d'arrêt du traitement.

Ils comprennent entre autres :

- Fatigue
- Maux de tête
- Nausées
- Difficulté à dormir
- Anémie
- Démangeaisons

Les nausées, la difficulté à dormir, l'anémie (diminution des globules rouges) et la démangeaison sont des effets indésirables associés à la ribavirine (Ibavyr<sup>MC</sup> ou Moderiba<sup>MC</sup>) pris en association avec l'**Holkira Pak<sup>MC</sup>**.

Avisez votre médecin et votre pharmacien de tout effet indésirable qui vous incommode ou qui persiste. Ils pourront vous conseiller afin de les gérer.

À moins d'une possibilité d'effets indésirables graves, n'arrêtez jamais votre traitement sans d'abord en parler à votre médecin ou à votre pharmacien.

## ● Est-ce que je peux prendre de l'alcool avec Holkira Pak<sup>MC</sup> ?

Idéalement, l'abstinence d'alcool (bière, vin et spiritueux) est fortement recommandée pour la population infectée par le VHC afin de protéger le foie. De plus l'alcool pourrait diminuer l'efficacité du traitement.

## ● Grossesse

On ne connaît pas encore les effets du **Holkira Pak<sup>MC</sup>** chez la femme enceinte. Il faut donc vous référer aux médicaments avec lesquels il est combiné.

Par exemple :

La ribavirine a été associée à des anomalies congénitales et/ou la mort du fœtus. Ainsi, lorsque combinée avec **Holkira Pak<sup>MC</sup>**, il convient de prendre minimum 2 moyens de contraception efficaces pour éviter une grossesse chez les patientes ou les conjointes des patients jusqu'à 6 mois après la fin du traitement.

Discutez-en avec votre médecin si vous voulez débiter un traitement contre le virus de l'hépatite C et que vous êtes enceinte ou désirez l'être.

## ● Allaitement

La présence du **Holkira Pak<sup>MC</sup>** et de ses métabolites dans le lait maternel est toujours inconnue. L'allaitement est donc déconseillé pendant le traitement avec **Holkira Pak<sup>MC</sup>**.

## ● Mode de conservation

Conservez les comprimés de **Holkira Pak<sup>MC</sup>** dans un endroit sec, à température ambiante ou au réfrigérateur (2 à 30 °C ou 35 à 86 °F); évitez les endroits humides tels que la salle de bains.

Gardez ce médicament dans son contenant original.

Tenez hors de portée et hors de vue des enfants.



## Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe traitante; ils pourront ainsi suivre étroitement votre état de santé.

Si vous avez des questions à propos de vos médicaments ou si vous désirez de l'aide afin de planifier la prise de vos médicaments, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien qui connaît bien votre médication.

Personne ressource :


\_\_\_\_\_

Téléphone :

\_\_\_\_\_

### J'ai oublié de prendre une dose !

Comprimé rose et comprimé bleu. Prenez les doses oubliées dès que possible et ensuite poursuivez votre traitement selon l'horaire prévu.




Plus de 6 h et moins de 12 h de retard



Comprimé rose :prenez la dose oubliée dès que possible et ensuite poursuivez votre traitement selon l'horaire prévu.  
Comprimé beige: laissez tomber la dose oubliée et prenez seulement la prochaine dose selon l'horaire prévu.

Comprimé rose et comprimé beige.Laissez tomber les doses oubliées et prenez seulement les prochaines doses selon l'horaire prévu.



Ne doublez pas la dose.

