

Infection au VIH
Guide Thérapeutique
www.jag.on.ca/hiv

ITRACONAZOLE (SPORANOX^{MD})

Capsule à 100 mg



Comment ce médicament agit-il ?



L'itraconazole est utilisé pour le traitement ou la prévention des infections fongiques (infection à champignons).

Comment prendre ce médicament ?

Votre posologie

Itraconazole

___ capsule(s) à 100 mg


___ fois par jour

L'itraconazole en capsule doit être pris avec un repas. La nourriture améliore l'absorption et l'efficacité de l'itraconazole en capsule.

La prise d'un jus d'orange ou d'un Coca-Cola^{MD} 15 minutes avant l'itraconazole en capsule peut également augmenter son absorption.

Il est important de prendre l'itraconazole de façon régulière, aux mêmes heures chaque jour et pour toute la durée du traitement, même si vous vous sentez mieux après quelque temps.

N'arrêtez jamais votre traitement sans d'abord en parler à votre médecin.



J'ai oublié de prendre une dose !

Prenez la dose oubliée dès que possible et poursuivez votre traitement selon l'horaire prévu.

Cependant, s'il est presque temps de prendre votre prochaine dose, prenez seulement cette dose selon l'horaire prévu. Ne doublez pas la dose.

Quels sont les effets indésirables de ce médicament ?



L'itraconazole est habituellement bien toléré.

Parfois l'itraconazole peut occasionner des nausées, des vomissements, une perte d'appétit, de la diarrhée et des douleurs abdominales. La prise de l'itraconazole avec nourriture permet de diminuer ces effets. Si ceux-ci se manifestent et persistent, consultez votre pharmacien, votre médecin ou votre diététiste, afin de trouver des solutions visant à gérer ces effets indésirables.

Il arrive qu'une réaction allergique survienne. Si vous notez l'apparition d'une éruption sur la peau (rash, rougeurs avec ou sans démangeaison) ou autres effets sur votre peau ou si vous avez de la fièvre ou de la difficulté à respirer, **avisez immédiatement un médecin.**

Plus rarement, on peut rencontrer une hépatite (inflammation du foie). **Avisez immédiatement votre médecin** si vous présentez deux ou plusieurs des symptômes suivants : nausées, vomissements, perte d'appétit, fatigue inhabituelle. **Avisez également votre médecin** si votre peau ou le blanc de vos yeux devient jaune ou si votre urine est foncée et que vos selles sont pâles. Par des prises de sang régulières, votre médecin surveillera l'effet de l'itraconazole sur votre foie.

D'autres effets tels que de la somnolence, des céphalées et des étourdissements pourraient survenir. *Assurez-vous des effets que l'itraconazole aura sur vous avant de conduire votre voiture ou d'entreprendre toute activité qui demande de l'attention.*



Est-ce que je peux prendre l'itraconazole avec mes autres médicaments ?

- **Les antiacides tels que : Maalox^{MD}, Amphogel^{MD}, Diovol^{MD} :** diminuent l'absorption et par conséquent l'efficacité de l'itraconazole. Évitez ces associations ou prenez l'itraconazole 2 heures avant ou au moins 6 heures après l'antiacide.
- **Autres médicaments utilisés contre l'acidité gastrique : ranitidine (Zantac^{MD}), famotidine (Pepcid^{MD}), cimétidine (Tagamet^{MD}), nizatidine (Axid^{MD}), oméprazole (Losec^{MD}), lansoprazole (Prevacid^{MD}), pantoprazole (Pantoloc^{MD}) :** L'utilisation de ces agents pourrait nuire de beaucoup à l'absorption et à l'efficacité de l'itraconazole. Si vous devez prendre ce genre de médicaments, il se peut que votre médecin augmente votre dose d'itraconazole ou modifie votre thérapie. La prise d'un jus d'orange ou d'un Coca-Cola^{MD} 15 minutes avant l'itraconazole améliore l'absorption de l'itraconazole malgré la présence de ces agents.

De plus, l'itraconazole peut interagir avec plusieurs autres médicaments.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un nouveau médicament sur ordonnance (prescription), un médicament en vente libre, un produit naturel ou même une drogue à usage récréatif.



Est-ce que je peux prendre l'alcool avec l'itraconazole ?

Évitez la consommation excessive ou régulière de boissons alcoolisées (bière, vin et spiritueux) qui peut augmenter le risque d'hépatite (inflammation du foie) ou interagir avec certains de vos médicaments.

Cependant, évitez de "sauter" une dose de médicament parce que vous désirez prendre une boisson alcoolisée. À moins d'avis contraire de votre médecin, une consommation raisonnable (sociale) d'alcool ne devrait pas nuire à votre état de santé.

Grossesse et allaitement



Généralement, l'itraconazole ne doit pas être utilisé chez la femme enceinte sauf dans certaines situations précises.

Le virus peut être transmis par le lait maternel. L'allaitement n'est donc pas recommandé chez la femme infectée par le VIH.

Mode de conservation


Conservez l'itraconazole dans un endroit sec, à la température ambiante (15 à 30°C ou 59 à 86°F). Évitez les endroits humides tels que la salle de bains.



Gardez hors de la vue et de la portée des enfants.

Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe soignante ; ils pourront ainsi suivre étroitement votre état de santé.



Si vous avez des questions à propos de vos médicaments ou si vous désirez de l'aide afin de planifier la prise de vos médicaments, n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien ou à votre médecin qui connaît bien votre médication.

Personne ressource : _____

Téléphone : _____