



Infection au VIH  
Guide Thérapeutique  
www.jag.on.ca/hiv

# OFLOXACINE (FLOXIN<sup>MD</sup>)

Comprimé à 200, 300 et 400 mg



## Comment ce médicament agit-il ?



L'ofloxacine est utilisée en association avec d'autres antibiotiques pour le traitement d'une infection par le complexe *Mycobacterium avium* (aussi appelé MAI, CMA ou MAC). Elle est également employée pour le traitement d'autres types d'infections bactériennes.

## Comment prendre ce médicament ?

Votre posologie

### Ofloxacine


\_\_\_ comprimé(s) à \_\_\_ mg

\_\_\_ fois par jour

L'ofloxacine peut être prise avec ou sans nourriture. Cependant, évitez de prendre l'ofloxacine avec du lait ou des produits laitiers car ils peuvent en diminuer l'absorption. Il serait préférable d'espacer l'administration de l'ofloxacine et des produits laitiers de 2 à 4 heures.

Il est important de prendre l'ofloxacine de façon régulière, aux mêmes heures chaque jour et pour toute la durée du traitement, même si vous vous sentez mieux après quelque temps.

*N'arrêtez jamais votre traitement sans d'abord en parler à votre médecin.*



## J'ai oublié de prendre une dose !

Prenez la dose oubliée dès que possible et poursuivez votre traitement selon l'horaire prévu.

Cependant, s'il est presque temps de prendre votre prochaine dose, prenez seulement cette dose selon l'horaire prévu. Ne doublez pas la dose.

## Quels sont les effets indésirables de ce médicament ?



Certaines personnes peuvent présenter des effets gastro-intestinaux (digestifs) tels que de la diarrhée, des douleurs abdominales, des nausées et des vomissements. Afin de diminuer ces effets, prendre l'ofloxacine avec de la nourriture. Si ceux-ci se manifestent et persistent, consultez votre pharmacien, votre médecin ou votre diététiste, afin de trouver des solutions visant à gérer ces effets indésirables.

Au début, il se peut que vous vous sentiez endormi ou étourdi. *Assurez-vous des effets que l'ofloxacine aura sur vous avant de conduire votre voiture ou d'entreprendre toute activité qui demande de l'attention.*

Rarement, il arrive qu'une réaction allergique survienne. Si vous notez l'apparition d'une éruption sur la peau (rash, rougeurs avec ou sans démangeaison) ou d'autres effets sérieux sur votre peau ou si vous avez de la difficulté à respirer, **avisez immédiatement un médecin.**

L'ofloxacine peut (rarement) rendre votre peau plus sensible au soleil ou à la lampe solaire. Afin de prévenir cet effet, utilisez un écran solaire avant toute exposition au soleil ou à la lampe solaire et évitez les expositions prolongées. Les écrans solaires recommandés pour la photosensibilité (augmentation de la sensibilité de la peau au soleil) sont: Ombrelle 60 et Anthélios"L".



## Est-ce que je peux prendre l'ofloxacine avec mes autres médicaments ?

- Les antiacides tels que : **Maalox<sup>MD</sup>**, **Amphogel<sup>MD</sup>**, **Diovol<sup>MD</sup>** diminuent l'absorption et par conséquent l'efficacité de l'ofloxacine.

Évitez ces associations ou prenez l'ofloxacin 2 heures avant ou au moins 6 heures après ces médicaments.

- **Les suppléments minéraux (ou multivitamines et minéraux) contenant du calcium ou du fer, ou du zinc, ou du magnésium ou de l'aluminium** diminuent l'absorption et par conséquent l'efficacité de l'ofloxacin. *Évitez ces associations ou prenez l'ofloxacin 2 heures avant ou au moins 6 heures après ces médicaments.*
- **Les formules nutritives (Ex.: Ensure<sup>MD</sup>, Nutren<sup>MD</sup>, Boost<sup>MD</sup>, etc.) ou les boissons enrichies de minéraux (fer, calcium, zinc, aluminium, magnésium)** diminuent l'absorption et par conséquent l'efficacité de l'ofloxacin. *Évitez ces associations ou prenez l'ofloxacin 2 heures avant ou au moins 6 heures après ces produits.*

L'ofloxacin peut interagir avec d'autres médicaments.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un nouveau médicament sur ordonnance (prescription), un médicament en vente libre, un produit naturel ou même une drogue à usage récréatif.



### Est-ce que je peux prendre de l'alcool avec l'ofloxacin ?

Évitez la consommation excessive ou régulière de boissons alcoolisées (bière, vin et spiritueux) qui peut interagir avec certains de vos médicaments.

Cependant, évitez de "sauter" une dose de médicament parce que vous désirez prendre une boisson alcoolisée. À moins d'avis contraire de votre médecin, une consommation raisonnable (sociale) d'alcool ne devrait pas nuire à votre état de santé.

## Grossesse et allaitement



Dans la majorité des cas, l'ofloxacin ne doit pas être utilisée chez la femme enceinte. Discutez-en avec votre médecin si vous voulez prendre l'ofloxacin et que vous êtes enceinte ou désirez l'être.

Le virus peut être transmis par le lait maternel. L'allaitement n'est donc pas recommandé chez la femme infectée par le VIH.

## Mode de conservation


Conservez l'ofloxacin dans un endroit sec, à la température ambiante (15 à 30°C ou 59 à 86°F) et protégée de la lumière. Évitez les endroits humides tels que la salle de bains.



Gardez hors de la vue et de la portée des enfants.

## Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe soignante ; ils pourront ainsi suivre étroitement votre état de santé.



Si vous avez des questions à propos de vos médicaments ou si vous désirez de l'aide afin de planifier la prise de vos médicaments, n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien ou à votre médecin qui connaît bien votre médication.

Personne ressource : \_\_\_\_\_

Téléphone : \_\_\_\_\_