



Ombistavir + Paritaprévir + Ritonavir (Technivie^{MC}) Comprimé à 12,5/75/50 mg

Comment ce médicament agit-il ?

Technivie^{MC} est une association de plusieurs agents antiviraux qui agissent ensemble pour traiter l'infection causée par le virus de l'hépatite C (VHC).

Technivie^{MC} en association avec d'autres médicaments bloque plusieurs étapes de la multiplication du virus et empêche la réplication du virus dans le but de favoriser la guérison.

● Comment prendre ce médicament ?

Technivie^{MC} ➔ 2 comprimés roses à 12,5/75/50 mg.
Prenez 2 comprimés 1 fois par jour le matin au déjeuner.

Ce médicament doit être pris avec de la nourriture. Le type d'aliments n'a pas d'importance.

Technivie^{MC} est toujours associé à d'autres médicaments agissant contre le VHC et ne doit pas être utilisé seul.

Il est important de prendre votre médicament de façon régulière, aux mêmes heures chaque jour et ce, pour toute la durée du traitement. Si vous oubliez des doses, cela pourrait compromettre la réussite du traitement et diminuer vos chances de guérir. De plus, le virus responsable de votre hépatite pourrait devenir résistant et rendre les médicaments moins efficaces ou même inutiles.

Est-ce que je peux prendre le Technivie^{MC} avec mes autres médicaments ?

Technivie^{MC} interagit avec de nombreux médicaments. Il est important de signaler à votre professionnel de santé tout médicament que vous prenez, sur une base régulière ou même occasionnellement.

Les médicaments suivants ne doivent pas être prescrits avec Technivie^{MC}. Informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez l'un ou plusieurs de ces médicaments :

- Médicaments pour les problèmes urinaires : alfuzosine (Xatral^{MC})
- Anti-convulsivants : carbamazépine (Tegretol^{MC}), phénytoïne (Dilantin^{MC}), phénobarbital (Phénobarb^{MC})
- Médicaments contre le cholestérol : lovastatine (Mevacor^{MC}), simvastatine (Zocor^{MC})
- Médicaments anti-tuberculeux : rifampine (Rifadin^{MC}, Rofact^{MC})
- Antirétroviraux contre l'infection par le VIH : éfavirenz (Atripla^{MC}, Sustiva^{MC}), étravirine (Intelence^{MC}), névirapine (Viramune^{MC}, Viramune XR^{MC})


- Médicaments contre la goutte : colchicine
- Médicaments pour l'insomnie ou utilisés avant une intervention médicale : midazolam (Versed^{MC}), triazolam (Halcion^{MC})
- Bosentan (Tracleer^{MC})
- Médicaments utilisés pour les migraines appelés dérivés de l'ergot : ergotamine (Ergomar^{MC}), dihydroergotamine (Migranal^{MC})
- Produits naturels : millepertuis (St. John's wort)
- Contraceptifs contenant de l'éthinylestradiol (comprimés, timbres ou anneaux vaginaux)
- Médicaments en pompe pour des problèmes respiratoires : salmétérol (Serevent^{MC}, Advair^{MC})
- Médicaments en pompe contenant des corticoïdes pour problème respiratoire : fluticasone (Flovent^{MC}, Avamys^{MC}, Advair^{MC}, Flonase^{MC}, Dymista^{MC}), mométasone (Asmanex^{MC}, Zenhale^{MC}, Nasonex^{MC}), budésonide (Symbicort^{MC}, Rhinocort^{MC}, Pulmicort^{MC})
- Médicaments neuroleptiques : pimozide
- Médicament pour prévenir la somnolence (narcolepsie) : modafinil (Alertec^{MC}).

D'autres médicaments qui n'apparaissent pas dans cette liste peuvent nécessiter un ajustement de dose lorsqu'ils sont administrés avec Technivie^{MC}. Par précaution, il est toujours préférable de consulter votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un nouveau médicament sur ordonnance (prescription), un médicament en vente libre, un produit naturel ou même une drogue à usage récréatif.

● Quels sont les effets indésirables de ce médicament ?

C'est un médicament qui est bien toléré en général, les effets indésirables principaux observés du Technivie^{MC} lorsqu'il est associé à la ribavirine (Ibavir^{MC} ou Moderiba^{MC}) sont d'intensité légère et ne nécessitent pas d'arrêt du traitement.

Ils comprennent entre autres :





- Fatigue
- Maux de tête
- Nausées
- Difficulté à dormir
- Anémie
- Démangeaisons

Les nausées, la difficulté à dormir, l'anémie (diminution des globules rouges) et la démangeaison sont des effets indésirables associés à la ribavirine (Ibavir^{MC} ou Moderiba^{MC}) pris en association avec le Technivie^{MC}.

Avisez votre médecin et votre pharmacien de tout effet indésirable qui vous incommoder ou qui persiste. Ils pourront vous conseiller afin de les gérer.

À moins d'une possibilité d'effets indésirables graves, n'arrêtez jamais votre traitement sans d'abord en parler à votre médecin ou à votre pharmacien.

● Est-ce que je peux prendre de l'alcool avec le Technivie^{MC} ?

Idéalement, l'abstinence d'alcool (bière, vin et spiritueux) est fortement recommandée pour la population infectée par le VHC afin de protéger le foie. De plus l'alcool pourrait diminuer l'efficacité du traitement.

Grossesse/contraception

On ne connaît pas encore les effets du Technivie^{MC} chez la femme enceinte. Il faut donc vous référer aux médicaments avec lesquels il est combiné.

Par exemple :

La ribavirine a été associée à des anomalies congénitales et/ou la mort du fœtus. Ainsi, lorsque combinée avec le Technivie^{MC}, il convient de prendre minimum 2 moyens de contraception

efficaces pour éviter une grossesse chez les patientes ou les conjointes des patients jusqu'à 6 mois après la fin du traitement.

Discutez-en avec votre médecin si vous voulez débiter un traitement contre le virus de l'hépatite C et que vous êtes enceinte ou désirez l'être.

● Allaitement

La présence du Technivie^{MC} et de ses métabolites dans le lait maternel est toujours inconnue. L'allaitement est donc déconseillé pendant le traitement de Technivie^{MC}.

Mode de conservation

Conservez les comprimés de Technivie^{MC} dans un endroit sec, à température ambiante ou au réfrigérateur (2 à 30 °C ou 35 à 86 °F); évitez les endroits humides tels que la salle de bains.

Gardez ce médicament dans son contenant original.

Tenez hors de portée et hors de vue des enfants.

● Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe traitante; ils pourront ainsi suivre étroitement votre état de santé.


Si vous avez des questions à propos de vos médicaments ou si vous désirez de l'aide afin de planifier la prise de vos médicaments, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien qui connaît bien votre médication.

Personne ressource : _____


Téléphone : _____

● J'ai oublié de prendre une dose !

Prenez la dose oubliée dès que possible et ensuite poursuivez votre traitement selon l'horaire prévu.



Plus de 12 h après



Laissez tomber la dose manquée et prenez seulement la prochaine dose selon l'horaire prévu.

Ne doublez pas la dose.