

# DORAVIRINE (PIFELTRO<sup>MD</sup>)

Comprimé 100 mg



## Comment ce médicament agit-il ?

La doravirine est un antirétroviral qui agit en empêchant la multiplication du virus de l'immunodéficience humaine (VIH). Il agit en inhibant une enzyme appelée la transcriptase inverse.

Le virus a besoin de cette enzyme pour se multiplier dans l'organisme. La doravirine est utilisée en association avec d'autres antirétroviraux afin de retarder la progression de la maladie et de réduire le risque d'apparition de diverses infections opportunistes (infections liées au sida).

La doravirine ne guérit pas le sida et n'élimine pas le virus. Vous risquez toujours de transmettre le VIH, soit par contact sexuel ou par contact avec le sang. Vous devez donc constamment prendre les précautions nécessaires (utilisation du condom en latex, de seringues propres, etc.).

## Comment prendre ce médicament ?

### Doravirine

□ 1 comprimé à 100 mg **1 fois** par jour

La doravirine peut être prise **avec ou sans nourriture**.

Il est important de prendre la doravirine de façon régulière, aux mêmes heures chaque jour, et de respecter l'horaire établi le plus fidèlement possible.

L'observance au traitement permettra de prévenir l'apparition de résistance (capacité du virus à reconnaître et à déjouer le médicament) et par conséquent l'échec du traitement (perte de l'efficacité du traitement antirétroviral) qui se traduirait par une augmentation de la charge virale et une diminution des cellules CD4 (cellules qui permettent à votre organisme de se défendre contre les infections).

Tout le monde peut être confronté, un jour ou l'autre, à un relâchement sur le plan de l'observance du traitement. La clé du succès demeure la motivation. N'hésitez pas à consulter l'équipe traitante afin qu'elle vous explique les bienfaits de la thérapie. Elle pourra également vous suggérer des outils qui vous aideront à observer votre traitement. À moins d'une possibilité d'effets indésirables

graves, n'arrêtez jamais votre traitement sans d'abord en parler à votre médecin.

## Est-ce que je peux prendre la doravirine avec mes autres médicaments ?

Informez votre professionnel de la santé si vous prenez un médicament :

- Pour le traitement de la tuberculose : rifampicine, Rifabutine (Mycobutin)
- Pour prévenir les crises convulsives comme carbamazépine (Tégrétol), oxcarbazépine (Trileptal), phénytoïne (Dilantin), phénobarbital (Phenobarb)
- Produit naturel : Millepertuis (St. John's Wort)

Ces médicaments sont contre-indiqués ou doivent être évités avec doravirine. Une solution de rechange ou des ajustements de doses avec un suivi plus étroit vous seront proposés.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un nouveau médicament sur ordonnance (prescription), un médicament en vente libre, un produit naturel ou même une drogue à usage récréatif.



## Quels sont les effets indésirables de ces médicaments ?

Effet normal qui disparaîtra ou peut être traité  
**Continuez le médicament**



- Fatigue
- Diarrhée
- Nausées

Avisez votre médecin et votre pharmacien de tout effet indésirable qui vous incommoder. Ils pourront vous conseiller afin de les gérer.

### Rash avec :

- Fièvre, ulcères (lésions) dans la bouche
- Enflure, cloque (bulles sur la peau)
- Rougeur des yeux
- Nausées, vomissements, diarrhée
- Douleurs musculaires et articulaires
- Grande fatigue

## J'ai oublié de prendre une dose !



Prenez la dose oubliée dès que possible et poursuivez votre traitement selon l'horaire prévu.

Cependant, s'il est presque temps de prendre votre prochaine dose, prenez seulement cette dose selon l'horaire prévu.

**Ne doublez pas la dose.**

## Est-ce que je peux prendre de l'alcool avec la doravirine ?

Évitez la consommation excessive ou régulière de boissons alcoolisées (bière, vin et spiritueux) qui peut augmenter le risque d'hépatite (inflammation du foie) ou interagir avec certains de vos médicaments.

Cependant, évitez de « sauter » une dose de médicament parce que vous désirez prendre une boisson alcoolisée. À moins d'avis contraire de votre médecin, une consommation raisonnable (sociale) et occasionnelle d'alcool ne devrait pas nuire à votre état de santé.

## Grossesse et allaitement

On ne connaît pas encore les effets de la doravirine chez la femme enceinte.

Discutez-en avec votre médecin si vous voulez prendre la doravirine et que vous êtes enceinte ou désirez l'être.

Le virus peut être transmis par le lait maternel. L'allaitement n'est donc pas recommandé chez la femme infectée par le VIH.

## Mode de conservation

Conservez les comprimés de doravirine dans un endroit sec, à la température ambiante (15 à 30°C ou 59 à 86°F). Évitez les endroits humides tels que la salle de bain.

Gardez ce médicament dans un contenant qui ferme bien, hors de la vue et de la portée des enfants.

## Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe traitante; ils pourront ainsi suivre étroitement votre état de santé.

Si vous avez des questions à propos de vos médicaments ou si vous désirez de l'aide afin de planifier la prise de vos médicaments, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien qui connaît bien votre médication.

Personne ressource : \_\_\_\_\_

Téléphone : \_\_\_\_\_