



Comment ce médicament agit-il ?

Daklinza^{MC} est un agent antiviral inhibiteur de la polymérase NS5B utilisé pour le traitement de l'infection causée par le virus de l'hépatite C (VHC).

En association avec d'autres médicaments, le Daklinza^{MC} empêche la réplication du virus dans le but de favoriser la guérison.

Comment prendre ce médicament ?

Daklinza^{MC} → 1 comprimé à 30 mg (vert foncé) ou 60 mg (vert pâle) **1 fois** par jour

Il peut être pris **avec ou sans nourriture**.

Daklinza^{MC} est toujours associé à d'autres médicaments agissant contre le VHC comme le sofosbuvir (Sovaldi^{MC}) et/ou la ribavirine (Ibavyr^{MC}) et ne doit pas être utilisé seul.

Il est important de prendre Daklinza^{MC} de façon régulière, aux mêmes heures chaque jour et ce, pour toute la durée du traitement. Si vous oubliez des doses, cela pourrait compromettre la réussite du traitement et diminuer vos chances de guérir. De plus, le virus responsable de votre hépatite pourrait devenir résistant et rendre les médicaments moins efficaces ou même inutiles.

La durée de traitement peut varier de 12 à 24 semaines dépendant :

- Du type de virus
- De votre condition hépatique
- De la réponse à un traitement antérieur

Est-ce que je peux prendre Daklinza^{MC} avec mes autres médicaments ?

Le daclatasvir interagit avec de nombreux autres médicaments. Il est important de signaler à votre professionnel de santé tout médicament que vous prenez sur une base régulière ou même occasionnellement.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant

de prendre un nouveau médicament sur ordonnance (prescription), un médicament en vente libre, un produit naturel ou même une drogue à usage récréatif.

Informez votre professionnel de la santé particulièrement si vous prenez ce qui suit:

- Médicaments contre les infections causées par des champignons comme kétoconazole, itraconazole (Sporanox), voriconazole (Vfend)
- Médicaments pour prévenir les crises convulsives comme carbamazépine (Tégrétol), oxcarbazépine (Trileptal), phénobarbital (Phenobarb), phénytoïne (Dilantin), topiramate (Topamax)
- Médicaments anti-inflammatoires comme dexaméthasone
- Médicaments contre les problèmes cardiaques comme amiodarone (Cordarone), diltiazem (Cardizem, Tiazac), vérapamil (Isoptin, Tarka), digoxine (Toloxin)
- Antibiotiques comme clarithromycine (Biaxin, Biaxin XL), érythromycine (Eryc, Erythro S)
- Médicaments pour le traitement de la tuberculose comme rifampine (Rifater, Rifadin, Rofact), rifabutine (Mycobutin)
- Médicaments pour abaisser le taux de cholestérol comme rosuvastatine (Crestor), atorvastatine (Lipitor), simvastatine (Zocor), fluvastatine (Lescol), lovastatine (Advicor, Mevacor)
- Médicaments pour traiter les caillots sanguins comme le dabigatran étexilate (Pradaxa)
- Médicament contre l'infection par le VIH comme atazanavir (Reyataz), darunavir (Prezista, Prezco-bix), ritonavir (Norvir), lopinavir/r (Kaletra), tipranavir (Aptivus), saquinavir (Invirase), éfavirenz (Sustiva, Atripla), étravirine (Intelence), névirapine (Viramune), elvitégravir/cobicistat (Stribild, Genvoya)
- Produit naturel : Millepertuis (Hypericum perforatum)
- Aliment : Pamplemousse

Quels sont les effets indésirables de ce médicament ?

C'est un médicament qui est bien toléré en général, les principaux effets indésirables observés de Daklinza^{MC} sont d'intensité légère et ne nécessitent pas d'arrêt du traitement.

Ils comprennent entre autres :

- Fatigue
- Maux de tête
- Brûlements d'estomac
- Anxiété
- Démangeaisons

Avisez votre médecin et votre pharmacien de tout effet indésirable qui vous incommodent ou qui persiste. Ils pourront vous conseiller afin de les gérer.

À moins d'une possibilité d'effets indésirables graves, n'arrêtez jamais votre traitement sans d'abord en parler à votre médecin ou à votre pharmacien.

Est-ce que je peux prendre de l'alcool avec Daklinza^{MC} ?

Idéalement, l'abstinence d'alcool (bière, vin et spiritueux) est fortement recommandée pour la population infectée par le VHC afin de protéger le foie.

Grossesse

Daklinza^{MC} est potentiellement toxique pour la femme enceinte et pour le fœtus. Si vous êtes traitée par Daklinza^{MC}, il convient de d'utiliser un moyen de contraception efficace jusqu'à 5 semaines après l'arrêt du traitement.

De plus, certains médicaments auxquels il est combiné sont eux aussi potentiellement toxiques.

Par exemple :

La ribavirine a été associée à des anomalies congé-

nitales et/ou la mort du fœtus. Ainsi, lorsque combinée avec Daklinza^{MC}, il convient de prendre minimum 2 moyens de contraception efficaces pour éviter une grossesse chez les patientes ou les conjointes des patients jusqu'à 6 mois après la fin du traitement.

Discutez-en avec votre médecin si vous voulez commencer un traitement contre le virus de l'hépatite C et que vous êtes enceinte ou désirez l'être.

Allaitement

La présence du daclatasvir et de ses métabolites dans le lait maternel est toujours inconnue. L'allaitement est donc déconseillé pendant le traitement avec Daklinza^{MC}.

Mode de conservation

Conservez les comprimés de Daklinza^{MC} dans un endroit sec, à la température ambiante (15 à 30°C ou 59 à 86°F). Évitez les endroits humides tels que la salle de bain.

Gardez ce médicament dans son contenant original. Tenez hors de portée et hors de vue des enfants.

Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe traitante; ils pourront ainsi suivre étroitement votre état de santé.

Si vous avez des questions à propos de vos médicaments ou si vous désirez de l'aide afin de planifier la prise de vos médicaments, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien qui connaît bien votre médication.

Personne ressource : _____

Téléphone : _____

© Octobre 2019, R. Therrien

J'ai oublié de prendre une dose !

Si moins de 20 h



Prenez la dose oubliée dès que possible et ensuite poursuivez votre traitement selon l'horaire prévu.

Laissez tomber la dose manquée et prenez seulement la prochaine dose selon l'horaire prévu.



Si plus de 20 h

Ne doublez pas la dose