



Comment ce médicament agit-il ?

Delstrigo® est une association de 3 antirétroviraux : la doravirine, la lamivudine et le ténofovir DF. Ce sont des antirétroviraux qui agissent en empêchant la multiplication du virus de l'immunodéficience humaine (VIH).

La lamivudine et le ténofovir DF font partie d'une classe de médicaments appelée les inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse. Ils agissent en inhibant une enzyme appelé la transcriptase inverse. La doravirine appartient à la classe des inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse et agit également sur cette enzyme mais avec un mécanisme différent de la lamivudine et du ténofovir DF.

Le virus a besoin de cette enzyme pour se multiplier dans l'organisme. Ainsi, la combinaison de ces antirétroviraux retardent la progression de la maladie et réduisent le risque d'apparition de diverses infections opportunistes.

Delstrigo® ne guérit pas le sida et n'élimine pas le virus. En présence d'une charge virale détectable, vous risquez toujours de transmettre le VIH, soit par contact sexuel ou par le sang. Vous devez donc prendre les précautions nécessaires (utilisation du condom en latex, de seringues propres, etc.).

Comment prendre ce médicament ?

Delstrigo® → 1 comprimé **1 fois** par jour

Il peut être pris **avec ou sans nourriture**.

Il est important de bien suivre la thérapie antirétrovirale, c'est-à-dire de ne pas oublier de doses, de suivre les directives concernant la façon de prendre vos médicaments et de ne pas cesser votre traitement. Il est important de prendre Delstrigo® de façon régulière, aux mêmes heures chaque jour, et de respecter l'horaire établi le plus fidèlement possible.

L'observance au traitement permettra de prévenir l'apparition de résistance (capacité du virus à reconnaître et à déjouer le médicament) et par conséquent l'échec du traitement (perte de l'efficacité du traitement antirétroviral) qui se traduirait par une augmentation de la charge virale et une diminution des

cellules CD4 (cellules qui permettent à votre organisme de se défendre contre les infections).

Tout le monde peut être confronté, un jour ou l'autre, à un relâchement sur le plan de l'observance du traitement. La clé du succès demeure la motivation. N'hésitez pas à consulter l'équipe traitante afin qu'elle vous explique les bienfaits de la thérapie. Elle pourra également vous suggérer des outils qui vous aideront à observer votre traitement.

À moins d'une possibilité d'effets indésirables graves, n'arrêtez jamais votre traitement sans d'abord en parler à votre médecin. Surtout si vous êtes porteur de l'hépatite B, l'arrêt de Delstrigo® peut aggraver l'hépatite.

Est-ce que je peux prendre Delstrigo® avec mes autres médicaments ?

Informez votre professionnel de la santé particulièrement si vous prenez un médicament qui suit :

- Pour prévenir les convulsions : carbamazépine, oxcarbazépine, phénytoïne, phénobarbital.
- Pour le traiter la tuberculose : rifampicine, rifabutine.
- Pour le traiter le cancer : enzalutamide, mitotane, dabrafénib.
- Produit naturel : millepertuis (*Hypericum perforatum*).
- Pour le traiter l'hépatite B : adéfovir dipivoxil.
- Pour les troubles du sommeil : modafinil.
- Autres médicaments qui contiennent du ténofovir DF, du ténofovir alafénamide, de la lamivudine ou de l'emtricitabine.

Ces médicaments sont contre-indiqués ou doivent être évités avec Delstrigo®. Une solution de rechange ou des ajustements de doses avec un suivi plus étroit vous seront proposés.

D'autres médicaments peuvent interagir avec Delstrigo®, vous devez informer votre médecin de tous les produits de santé que vous prenez.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un nouveau médicament sur ordonnance (prescription), un médicament en vente libre, un produit naturel ou même une drogue à usage récréatif.

Quels sont les effets indésirables de ce médicament ?

Effets normaux qui disparaîtront ou peuvent être traités

Continuez le médicament

- Étourdissements
- Rêves étranges, difficulté à dormir, cauchemars
- Maux de tête
- Nausées, diarrhée, vomissements
- Fatigue
- Sensation de faiblesse
- Dépression

Voyez **IMMÉDIATEMENT** votre médecin

Rash avec :

- Fièvre, ulcères (lésions) dans la bouche
- Enflure, cloque (bulles sur la peau)
- Rougeur des yeux
- Nausées, vomissements, diarrhée
- Douleurs musculaires ou articulaires
- Grande fatigue



Avisez votre médecin et votre pharmacien de tout effet indésirable qui vous incommode ou de symptôme non mentionné dans le présent document ou d'aggravation d'un symptôme vous empêchant de vaquer à vos occupations quotidiennes. Ils pourront vous conseiller afin de les gérer.

J'ai oublié une dose !

Prenez la dose oubliée dès que possible et ensuite poursuivez votre traitement selon l'horaire prévu.



S'il est presque temps de prendre votre prochaine dose :

Laissez tomber la dose manquée et continuez selon l'horaire prévu.

Ne doublez pas la dose.

Grossesse et allaitement

On ne connaît pas encore les effets de Delstrigo® chez la femme enceinte. Les femmes fertiles doivent utiliser une méthode de contraception adéquate.

Discutez-en avec votre médecin si vous voulez prendre Delstrigo® et que vous êtes enceinte ou désirez l'être.

Le virus peut être transmis par le lait maternel. L'allaitement n'est donc pas recommandé chez la femme infectée par le VIH.

Mode de conservation

Conservez les comprimés de Delstrigo® dans un endroit sec, à la température ambiante (15 à 30°C ou 59 à 86°F). Évitez les endroits humides tels que la salle de bain.

Gardez ce médicament dans un contenant qui ferme bien. Tenez hors de portée et hors de vue des enfants.

Est-ce que je peux prendre de l'alcool avec Delstrigo® ?

Évitez la consommation excessive ou régulière de boissons alcoolisées (bière, vin et spiritueux) qui peut augmenter le risque d'hépatite (inflammation du foie) ou interagir avec certains de vos médicaments.

Cependant, évitez de « sauter » une dose de médicament parce que vous désirez prendre une boisson alcoolisée. À moins d'avis contraire de votre médecin, une consommation raisonnable (sociale) et occasionnelle d'alcool ne devrait pas nuire à votre état de santé.

Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe traitante; ils pourront ainsi suivre étroitement votre état de santé.

Si vous avez des questions à propos de vos médicaments ou si vous désirez de l'aide afin de planifier la prise de vos médicaments, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien qui connaît bien votre médication.

Personne ressource : _____

Téléphone : _____