



Comment ce médicament agit-il ?

Sovaldi^{MD} est un agent antiviral inhibiteur de la polymérase NS5B utilisé pour le traitement de l'infection causée par le virus de l'hépatite C (VHC).

En association avec d'autres médicaments, le Sovaldi^{MD} empêche la réplication du virus dans le but de favoriser la guérison.

Comment prendre ce médicament ?

Sovaldi^{MD} → 1 comprimé **1 fois** par jour

Il peut être pris **avec ou sans nourriture**.

Sovaldi^{MD} est toujours associé à d'autres médicaments agissant contre le VHC et ne doit pas être utilisé seul.

Il est important de prendre Sovaldi^{MD} de façon régulière, aux mêmes heures chaque jour et ce, pour toute la durée du traitement. Si vous oubliez des doses, cela pourrait compromettre la réussite du traitement et diminuer vos chances de guérir. De plus, le virus responsable de votre hépatite pourrait devenir résistant et rendre les médicaments moins efficaces ou même inutiles.

Est-ce que je peux prendre Sovaldi^{MD} avec mes autres médicaments ?

Peu d'interactions médicamenteuses sont attendues avec Sovaldi^{MD}.

Cependant, les médicaments suivants ne doivent pas être associés avec Sovaldi^{MD}. Ne prenez pas Sovaldi^{MD} et informez votre médecin ou votre pharmacien si vous prenez l'un ou plusieurs de ces médicaments :

- Médicaments pour contrôler le rythme cardiaque comme amiodarone (Cordarone)
- Médicaments pour prévenir les crises convulsives comme carbamazépine (Tégrétol), oxcarbazépine (Trileptal), phénobarbital (Phenobarb), phénytoïne (Dilantin)

- Médicaments pour le traitement de la tuberculose comme rifampine (Rifater, Rifadin, Rofact), rifabutine (Mycobutin)
- Produit naturel : Millepertuis (*Hypericum perforatum*)

Attention car Sovaldi^{MD} n'est jamais prescrit seul et est toujours associé à d'autres médicaments. Reportez-vous aux informations qui vous ont été données concernant les interactions médicamenteuses de vos autres traitements.

Par précaution, il est toujours préférable de consulter votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un nouveau médicament sur ordonnance (prescription), un médicament en vente libre, un produit naturel ou même une drogue à usage récréatif.

Grossesse et allaitement

On ne connaît pas encore les effets du Sovaldi^{MD} chez la femme enceinte. Il faut aussi vous référer aux médicaments avec lesquels il est combiné.

Par exemple :

La ribavirine a été associée à des anomalies congénitales et/ou la mort du fœtus. Ainsi, lorsque combinée avec Sovaldi^{MD} +/- peg-interferon, il convient de prendre minimum 2 moyens de contraception efficaces pour éviter une grossesse chez les patientes ou les conjointes des patients jusqu'à 6 mois après la fin du traitement.

Discutez-en avec votre médecin si vous voulez commencer un traitement contre le virus de l'hépatite C et que vous êtes enceinte ou désirez l'être.

La présence du sofosbuvir et de ses métabolites dans le lait maternel est toujours inconnue. L'allaitement est donc déconseillé pendant le traitement avec Sovaldi^{MD}

Quels sont les effets indésirables de ce médicament ?

C'est un médicament qui est bien toléré en général, les principaux effets indésirables de Sovaldi^{MD} observés lorsqu'il est associé à la ribavirine (Ibavyr^{MD}) sont d'intensité légère et ne nécessite pas d'arrêt du traitement.

Ils comprennent entre autres :

- Fatigue
- Maux de tête
- Difficulté à dormir
- Nausées
- État triste/irritable
- Anémie (diminution des globules rouges)

Les vomissements sont peu fréquents. Par contre, si vous avez des vomissements :

- **Moins de 2 heures après la prise de Sovaldi^{MD}**, il faut reprendre une autre dose.
- **Plus de 2 heures après la prise de Sovaldi^{MD}**, il faut reprendre la dose suivante au moment prévu initialement.

Cependant, les médicaments utilisés en combinaison avec Sovaldi^{MD} peuvent causer d'autres effets indésirables. Référez-vous aux médicaments avec lesquels il est combiné pour connaître les effets indésirables possibles.

Avisez votre médecin et votre pharmacien de tout effet indésirable qui vous incommoder ou qui persiste. Ils pourront vous conseiller afin de les gérer.

N'arrêtez jamais votre traitement sans d'abord en parler à votre médecin ou à votre pharmacien.

Est-ce que je peux prendre de l'alcool avec Sovaldi^{MD} ?

Idéalement, l'abstinence d'alcool (bière, vin et spiritueux) est fortement recommandée pour la population infectée par le VHC afin de protéger le foie.

Mode de conservation

Conservez les comprimés de Sovaldi^{MD} dans un endroit sec, à une température entre 15°C et 30°C (59 et 86°F). Évitez les endroits humides tels que la salle de bain.

Gardez ce médicament dans son contenant original. Tenez hors de portée et hors de vue des enfants.

Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe traitante; ils pourront ainsi suivre étroitement votre état de santé.

Si vous avez des questions à propos de vos médicaments ou si vous désirez de l'aide afin de planifier la prise de vos médicaments, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien qui connaît bien votre médication.

Personne ressource : _____

Téléphone : _____

@ Octobre 2019, R. Therrien

J'ai oublié de prendre une dose !

Si moins de 12 h



Prenez la dose oubliée dès que possible et ensuite poursuivez votre traitement selon l'horaire prévu.

Laissez tomber la dose manquée et prenez seulement la prochaine dose selon l'horaire prévu.

Ne doublez pas la dose



Si plus de 12 h