



## Comment ce médicament agit-il ?

Descovy<sup>MD</sup> est une association de 2 antirétroviraux : l'emtricitabine et le ténofovir alafénamide (TAF) qui agissent en empêchant la multiplication du virus de l'immunodéficience humaine (VIH). Ils font partie d'une classe de médicaments appelée les inhibiteurs nucléosidiques de la transcriptase inverse. Ils agissent en inhibant une enzyme appelée la transcriptase inverse.

Le virus a besoin de ces enzymes pour se multiplier dans l'organisme. Ainsi, la combinaison de ces antirétroviraux peut aider à réduire le risque d'infection par le VIH.

La **prophylaxie pré-exposition**, ou **PrEP**, est une méthode de prévention de la transmission du VIH reposant sur l'utilisation de médicaments anti-rétroviraux destinée aux personnes séronégatives pour le VIH et exposées à un risque important de contracter le VIH.

## Comment prendre ce médicament ?

Descovy<sup>MD</sup> n'est pas recommandé chez les personnes présentant un risque d'infection par le VIH lié à la pratique de relations sexuelles vaginales réceptives, parce que son efficacité n'a pas été établie dans cette population.

### PrEP continue

- 1 comprimé **1 fois** par jour soit toutes les 24 heures

La PrEP en continue sera efficace après 7 jours lors de rapports anaux.

Il est à noter que l'efficacité de la PrEP sur demande ou intermittente n'a pas été étudiée avec Descovy<sup>MD</sup>.

Descovy<sup>MD</sup> peut être pris **avec ou sans nourriture**.

Il est important de prendre Descovy<sup>MD</sup> de façon régulière, aux mêmes heures chaque jour, et de respecter l'horaire établi le plus fidèlement possible.


Si vous souhaitez arrêter la PrEP ou la reprendre après une période d'arrêt, vous devez consulter votre professionnel de la santé pour savoir comment procéder en toute sécurité.

Après une exposition à risque alors que la prise de la PrEP n'a pas été adéquate, consultez votre médecin le plus rapidement possible pour évaluer s'il est nécessaire de recevoir la prophylaxie postexposition (PPE).

## J'ai oublié une dose !

### Le jour de la dose oubliée :

Prenez la dose oubliée dès que possible et ensuite poursuivez votre traitement selon l'horaire prévu.



## Est-ce que je peux prendre Descovy<sup>MD</sup> avec mes autres médicaments ?

Les médicaments suivants peuvent interagir avec Descovy<sup>MD</sup> :

- Carbamazépine, oxcarbazépine, phénobarbital ou phénytoïne pour prévenir les convulsions.
- Rifampicine, rifabutine ou rifapentine pour traiter la tuberculose.
- Produit naturel contenant du millepertuis (*Hypericum perforatum*) pour traiter la dépression.

Vous devez en discuter avec votre médecin avant de prendre ces médicaments. Une solution de rechange ou des ajustements de doses pourront vous être proposés si nécessaire.

Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre de nouveaux médicaments avec ou sans ordonnance, un produit naturel ou même une drogue à usage récréatif.

## Quels sont les effets indésirables de ce médicament ?

Descovy<sup>MD</sup> est généralement bien toléré. Il se peut que vous ressentiez, au début de votre traitement, certains maux tels que :

- Nausées
- Diarrhée
- Maux de tête
- Fatigue

Ces effets indésirables tendent à disparaître après les premières semaines.

L'utilisation de la PrEP a été associée à certains effets toxiques plus sérieux chez un faible nombre de personnes, par exemple, à des baisses légères

de la santé des os. Fait encourageant, ces changements étaient réversibles après l'arrêt de la PrEP.

À chaque 3 mois, votre médecin fera une prise de sang et une fois par année une analyse d'urine pour vérifier la santé de vos reins.

Avisez votre médecin et votre pharmacien de tout effet indésirable qui vous incommode. Ils pourront vous conseiller afin de les gérer.



## Je souhaite cesser la PrEP. Comment dois-je faire?

### Population HARSAH

Si l'arrêt de PrEP est envisagé, celle-ci doit se poursuivre pendant au moins 48 heures après la dernière exposition à risque.

À noter que si vous êtes porteur de l'hépatite B, il faut d'abord en discuter avec votre médecin pour effectuer un suivi approprié. L'arrêt de Descovy<sup>MD</sup> pourrait réactiver ou réveiller le virus de l'hépatite B ce qui pourrait endommager votre foie et nécessiter une hospitalisation.

## Est-ce que je peux prendre de l'alcool avec Descovy<sup>MD</sup> ?

Évitez de sauter une dose parce que vous désirez prendre une boisson alcoolisée. Privilégiez une consommation modérée.

À moins d'avis contraire de votre médecin, une consommation raisonnable et occasionnelle d'alcool ne devrait pas nuire.

## Mode de conservation

Conservez les comprimés de Descovy<sup>MD</sup> à une température inférieure à 30°C (86°F).

Gardez ce médicament dans un contenant qui ferme bien. Tenez hors de portée et hors de vue des enfants.

## Conseils généraux

Consultez régulièrement votre médecin, en général un mois après le début de la PrEP puis aux 3 mois par la suite afin de passer des tests de dépistage du VIH et des ITS ainsi qu'une prise de sang et/ou analyse d'urine.

Si vous avez des questions à propos de vos médicaments ou si vous désirez de l'aide afin de planifier la prise de vos médicaments, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien qui connaît bien votre médication.

Personne ressource : \_\_\_\_\_

Téléphone : \_\_\_\_\_