



## Comment ce médicament agit-il ?

Edurant<sup>MD</sup> est un antirétroviral, la rilpivirine, qui agit en empêchant la multiplication du virus de l'immuno-déficience humaine (VIH).

La rilpivirine fait partie d'une classe de médicaments appelée les inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse, une enzyme, et elle agit en inhibant cette enzyme. Le virus a besoin de cette enzyme pour se multiplier dans l'organisme. Ainsi Edurant<sup>MD</sup>, lorsque pris fidèlement en association avec d'autres antirétroviraux, maintient la charge virale indétectable et permet de rester en santé.

### I = I

En présence d'une charge indétectable, vous ne risquez pas de transmettre le VIH. Indétectable = Intransmissible (I = I). Par contre, en présence d'une charge virale détectable, vous risquez toujours de transmettre le VIH, soit par contact sexuel ou par le sang. Vous devez donc prendre les précautions nécessaires (utilisation du condom en latex, de seringues propres, etc.).

## Comment prendre ce médicament ?

Edurant<sup>MD</sup> doit être pris en association avec d'autres antirétroviraux. De plus, avant de débiter les injections de Cabenuva<sup>MD</sup>, un traitement préliminaire optionnel par voie orale avec Vocabria<sup>MD</sup> et Edurant<sup>MD</sup> peut vous être prescrit pendant au moins 28 jours, y compris le jour où vous commencez les injections.

**Edurant<sup>MD</sup> → 1 comprimé 1 fois par jour**

Edurant<sup>MD</sup> doit être pris **avec un repas**. La prise de la rilpivirine avec une boisson nutritionnelle riche en protéines (Boost, Ensure, etc.) ne remplace pas un repas et n'est pas suffisante pour favoriser l'absorption de la rilpivirine.

Il est important de prendre la rilpivirine de façon régulière, aux mêmes heures chaque jour, et de respecter l'horaire établi le plus fidèlement possible. L'observance au traitement permettra de prévenir l'apparition de résistance (capacité du virus à reconnaître et à déjouer le médicament) et par conséquent l'échec du traitement (perte de l'efficacité

du traitement antirétroviral) qui se traduirait par une augmentation de la charge virale et une diminution des cellules CD4 (cellules qui permettent à votre organisme de se défendre contre les infections).

## Est-ce que je peux recevoir Edurant<sup>MD</sup> avec mes autres médicaments ?

Les médicaments suivants sont contre-indiqués et ne doivent pas être pris avec Edurant<sup>MD</sup> :

- Carbamazépine, oxcarbazépine, phénobarbital ou phénytoïne pour prévenir les convulsions.
- Rifampicine ou rifapentine pour traiter certaines infections bactériennes comme la tuberculose.
- Dexaméthasone (plus d'une dose) pour traiter l'inflammation et les réactions allergiques.
- Produits naturels contenant du millepertuis (*Hypericum perforatum*) pour traiter la dépression.
- Oméprazole, ésoméprazole, lansoprazole, pantoprazole ou rabéprazole pour réduire l'acidité gastrique.

Les médicaments suivants pourraient aussi interagir avec Edurant<sup>MD</sup> en diminuant l'efficacité ou l'absorption d'Edurant<sup>MD</sup> :

- Rifabutine pour traiter certaines infections bactériennes comme la tuberculose : on doit prendre 2 comprimés d'Edurant<sup>MD</sup> une fois par jour durant la prise de rifabutine.
- Médicaments contenant des cations polyvalents (antiacides, laxatifs, sucralfate) : ils doivent être pris 2 heures avant ou 4 heures après Edurant<sup>MD</sup>.
- Famotidine, cimétidine, nizatidine ou ranitidine pour réduire l'acidité gastrique : ils doivent être pris 12 heures avant ou 4 heures après Edurant<sup>MD</sup>.

Vous devez en discuter avec votre médecin avant de prendre ces médicaments.

D'autres médicaments ou produits pourraient interagir avec Edurant<sup>MD</sup>. Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un nouveau médicament sur ordonnance, un médicament en vente libre, un produit naturel ou même une drogue à usage récréatif. Une solution de rechange, des ajustements de doses ou un suivi plus étroit vous seront proposés si nécessaire.

## Quels sont les effets indésirables de ce médicament ?

Effets normaux et habituellement légers qui disparaissent avec le temps ou peuvent être traités :

- Maux de tête, étourdissements
- Sensation de fatigue ou de faiblesse
- Maux d'estomac, nausées, diarrhée
- Diminution de l'appétit
- Troubles du sommeil (difficultés à s'endormir ou à rester endormi)

Avisez votre médecin et votre pharmacien de tout effet indésirable qui vous incommoder ou de symptôme non mentionné dans le présent document ou aggravation d'un symptôme vous empêchant de vaquer à vos occupations quotidiennes. Ils pourront vous conseiller afin de les gérer.

Consulter rapidement votre médecin ou pharmacien :

- Symptômes de dépression, anxiété
- Éruption cutanée seule

Cessez le médicament et présentez-vous **IMMÉDIATEMENT** dans une clinique ou aux urgences

### Éruption cutanée sévère avec ou sans :

- Fièvre
- Manque d'énergie (fatigue)
- Douleurs musculaires ou articulaires




**Suivi médical :** Par des prises de sang régulières et autres tests si nécessaire, votre médecin surveillera les effets du médicament sur votre système.

## J'ai oublié une dose !

### Si moins de 12 heures après l'heure prévue :

Prenez la dose oubliée dès que possible et ensuite poursuivez votre traitement selon l'horaire habituel.



### Si plus de 12 heures après l'heure prévue :

Laissez tomber la dose manquée et continuez selon l'horaire habituel.

**Ne doublez pas la dose.**

## Grossesse et allaitement

Discutez-en avec votre médecin si vous voulez recevoir Edurant<sup>MD</sup> et que vous êtes enceinte ou désirez l'être.

Le virus peut être transmis par le lait maternel. L'allaitement n'est donc pas recommandé chez la femme infectée par le VIH.

## Est-ce que je peux prendre de l'alcool avec Edurant<sup>MD</sup> ?

Évitez la consommation excessive ou régulière de boissons alcoolisées (bière, vin et spiritueux) qui peut augmenter le risque d'hépatite (inflammation du foie) ou interagir avec certains de vos médicaments.

À moins d'avis contraire de votre médecin, une consommation raisonnable (sociale) et occasionnelle d'alcool ne devrait pas nuire à votre état de santé.

## Mode de conservation

Conservez Edurant<sup>MD</sup> à une température ambiante de 15 à 30°C (59 à 86°F) dans le flacon remis par le pharmacien et mettez-le à l'abri de la lumière.

Gardez ce médicament hors de portée et hors de vue des enfants.

## Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe traitante; ils pourront ainsi suivre étroitement votre état de santé.

Si vous avez des questions à propos de vos médicaments ou si vous désirez de l'aide afin de planifier la prise de vos médicaments, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien qui connaît bien votre médication.

Personne ressource : \_\_\_\_\_

Téléphone : \_\_\_\_\_