



Comment ce médicament agit-il ?

Celsentri^{MD} est un antirétroviral, le maraviroc, qui agit en empêchant la multiplication du virus de l'immuno-déficience humaine (VIH).

Le maraviroc fait partie d'une classe de médicaments appelée les inhibiteurs de l'entrée et de l'attachement. Il agit en bloquant le récepteur CCR5, de manière à ce que le virus du VIH ne puisse pas s'en servir pour entrer dans les cellules du système immunitaire (CD4). Ainsi Celsentri^{MD}, lorsque pris fidèlement en association avec d'autres antirétroviraux, maintient la charge virale indétectable et permet de rester en santé. Avant l'utilisation du maraviroc votre médecin vérifiera par un test si vous avez un virus à tropisme CCR5 (type de virus qui utilise ce récepteur).

I = I

En présence d'une charge indétectable, vous ne risquez pas de transmettre le VIH. Indétectable = Intransmissible (I = I). Par contre, en présence d'une charge virale détectable, vous risquez toujours de transmettre le VIH, soit par contact sexuel ou par le sang. Vous devez donc prendre les précautions nécessaires (utilisation du condom en latex, de seringues propres, etc.).

Comment prendre ce médicament ?

Celsentri^{MD} doit être pris avec d'autres antirétroviraux.

Celsentri → 1 comprimé de 300 mg **2 fois** par jour

Pour certains patients, en raison des interactions possibles avec les autres médicaments qu'ils prennent ou s'ils ont des problèmes rénaux, il peut être prescrit ainsi :

Celsentri → 1 comprimé de 150 mg **2 fois** par jour

Celsentri → 2 comprimés de 300 mg **2 fois** par jour

Votre médecin vous dira quelle posologie utiliser.

Il peut être pris **avec ou sans nourriture**.

Il est important de prendre Celsentri^{MD} de façon régulière, aux mêmes heures chaque jour, et de respecter l'horaire établi le plus fidèlement possible. L'observance

au traitement permettra de prévenir l'apparition de résistance (capacité du virus à reconnaître et à déjouer le médicament) et par conséquent l'échec du traitement (perte de l'efficacité du traitement antirétroviral) qui se traduirait par une augmentation de la charge virale et une diminution des cellules CD4 (cellules qui permettent à votre organisme de se défendre contre les infections).

Tout le monde peut être confronté, un jour ou l'autre, à un relâchement sur le plan de l'observance du traitement. La clé du succès demeure la motivation. N'hésitez pas à consulter l'équipe traitante afin qu'elle vous explique les bienfaits de la thérapie. Elle pourra également vous suggérer des outils qui vous aideront à observer votre traitement.

À moins d'une possibilité d'effets indésirables graves, n'arrêtez jamais votre traitement sans d'abord en parler à votre médecin.

Est-ce que je peux prendre Celsentri^{MD} avec mes autres médicaments ?

Plusieurs médicaments ou produits interagissent ou pourraient interagir avec Celsentri^{MD} et des ajustements de dose pourront être nécessaires.

Parmi ceux-ci, on retrouve :

- Carbamazépine, oxcarbazépine, phénytoïne ou phénobarbital pour prévenir les convulsions.
- Clarithromycine, kétoconazole, itraconazole ou rifampicine pour traiter certaines infections.
- Atazanavir, atazanavir/ritonavir, darunavir/ritonavir, éfavirenz, étravirine, lopinavir/ritonavir ou névirapine pour traiter le VIH.
- Produits naturels contenant du millepertuis (*Hypericum perforatum*) pour traiter la dépression.

Vous devez en discuter avec votre médecin avant de les prendre.

D'autres médicaments ou produits pourraient interagir avec Celsentri^{MD}. Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un nouveau médicament sur ordonnance, un médicament en vente libre, un produit naturel ou même une drogue à usage récréatif.

Quels sont les effets indésirables de ce médicament ?

Effets normaux et habituellement légers qui disparaîtront avec le temps ou peuvent être traités :

- Diarrhée, flatulences, nausées
- Maux de tête

Avisez votre médecin et votre pharmacien de tout effet indésirable qui vous incommode ou de symptôme non mentionné dans le présent document ou aggravation d'un symptôme vous empêchant de vaquer à vos occupations quotidiennes. Ils pourront vous conseiller afin de les gérer.

Consulter rapidement votre médecin ou pharmacien :

- Fatigue
- Toux, symptômes ressemblant à ceux de la grippe
- Éruption cutanée seule

Si vous êtes porteur de l'hépatite B ou C, vous courez un risque plus élevé de problèmes hépatiques.

Cessez le médicament et présentez-vous **IMMÉDIATEMENT** dans une clinique ou aux urgences

Symptômes hépatiques :

- Éruption cutanée et démangeaisons intenses
- Urine foncée et/ou jaunissement de la peau et du blanc des yeux
- Vomissement et/ou douleur dans le haut du ventre

Éruption cutanée sévère avec ou sans :

- Fièvre
- Manque d'énergie (fatigue)
- Douleurs musculaires ou articulaires



Suivi médical : Par des prises de sang régulières et autres tests si nécessaire, votre médecin surveillera les effets du médicament sur votre système.

J'ai oublié une dose !

Prenez la dose oubliée dès que possible et ensuite poursuivez votre traitement selon l'horaire prévu.

S'il est presque temps de prendre votre prochaine dose :

Laissez tomber la dose manquée et continuez selon l'horaire prévu.

Ne doublez pas la dose.



Grossesse et allaitement

Discutez-en avec votre médecin si vous voulez recevoir Celsentri^{MD} et que vous êtes enceinte ou désirez l'être.

Le virus peut être transmis par le lait maternel. L'allaitement n'est donc pas recommandé chez la femme infectée par le VIH.

Mode de conservation

Conservez Celsentri^{MD} à une température ambiante de 15 à 30°C (59 à 86°F).

Gardez ce médicament dans un contenant qui ferme bien. Tenez hors de portée et hors de vue des enfants.

Est-ce que je peux prendre de l'alcool avec Celsentri^{MD} ?

Évitez la consommation excessive ou régulière de boissons alcoolisées (bière, vin et spiritueux) qui peut augmenter le risque d'hépatite (inflammation du foie) ou interagir avec certains de vos médicaments.

Cependant, évitez de « sauter » une dose de médicament parce que vous désirez prendre une boisson alcoolisée. À moins d'avis contraire de votre médecin, une consommation raisonnable (sociale) et occasionnelle d'alcool ne devrait pas nuire à votre état de santé.

Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe traitante; ils pourront ainsi suivre étroitement votre état de santé.

Si vous avez des questions à propos de vos médicaments ou si vous désirez de l'aide afin de planifier la prise de vos médicaments, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien qui connaît bien votre médication.

Personne ressource : _____

Téléphone : _____