



La **prophylaxie post-exposition**, ou **PPE**, est une méthode de prévention de la transmission du virus de l'immunodéficience humaine (VIH) reposant sur l'utilisation rapide de médicaments antirétroviraux suite à une exposition avec un risque important de contracter le VIH.

Comment ce médicament agit-il ?

Prezista^{MD} et Norvir^{MD} sont des antirétroviraux, le darunavir et le ritonavir. Ils font partie d'une classe de médicaments appelée les inhibiteurs de la protéase. Ces médicaments inhibent une enzyme dont le VIH a besoin pour se multiplier dans l'organisme. Le ritonavir est aussi utilisé pour potentialiser l'effet du darunavir.

Prezista^{MD} et Norvir^{MD} sont utilisés en association avec d'autres antirétroviraux le plus rapidement possible après une exposition au VIH afin d'empêcher le virus de se propager dans l'organisme et d'éviter ainsi une infection.

Comment prendre ce médicament ?

Prezista/Norvir^{MD} → 1 comprimé de chaque
1 fois par jour aux 24 heures

Prezista^{MD} et Norvir^{MD} doivent être pris **en même temps** et **avec de la nourriture**.

Il est important de prendre Prezista/Norvir^{MD} de façon régulière, à la même heure chaque jour, et de respecter l'horaire établi le plus fidèlement possible.

N'arrêtez jamais votre traitement sans d'abord en parler à votre médecin.

J'ai oublié de prendre une dose !

Si plus de 12 heures avant l'heure prévue :

Prenez la dose oubliée dès que possible et ensuite poursuivez votre traitement selon l'horaire habituel.



Si 12 heures ou moins avant l'heure prévue :

Laissez tomber la dose manquée et continuez selon l'horaire habituel.

Ne doublez pas la dose.

Quels sont les effets indésirables de ce médicament ?

Prezista^{MD} et Norvir^{MD} sont généralement bien tolérés. Il se peut que vous ressentiez, au début de votre traitement, certains effets gastro-intestinaux (digestifs) tels que de la diarrhée, des selles molles, des douleurs abdominales et des nausées.

D'autres effets indésirables fréquemment rencontrés sont la sensation de fatigue ou de faiblesse, et les maux de tête. Parfois, Prezista^{MD} peut causer des rougeurs sur la peau. Contactez votre médecin ou pharmacien, mais continuez de prendre votre médicament. Toutefois, si les rougeurs s'accompagnent de fièvre, d'ulcères dans la bouche, de maux de ventre ou de malaises généraux, consultez immédiatement un médecin.

Si des effets indésirables se manifestent et persistent, consultez votre pharmacien, votre médecin, une infirmière ou une diététiste afin de trouver des solutions visant à les gérer.

Grossesse

Si vous êtes enceinte, si vous désirez l'être ou si vous allaitez, avisez-en votre médecin avant de prendre Prezista^{MD} et Norvir^{MD}.

Est-ce que je peux prendre Prezista^{MD} et Norvir^{MD} avec mes autres médicaments ?

Les médicaments suivants sont contre-indiqués ou à éviter et ne doivent pas être pris avec Prezista^{MD} ou Norvir^{MD} :

- Acide fusidique, alfuzosine, amiodarone, apixaban, colchicine (chez patients avec insuffisance rénale et/ou hépatique), dérivés ergoliniques (dihydroergotamine, ergonovine, ergotamine, méthylergonovine), dronédarone, évérolimus, flécaïnide, glécaprèvir/pibrentasvir, ibrutinib, ivabradine, lidocaïne (à action générale), lomitapide, lovastatine, lurasidone, naloxéol, nélatinib, pimizide, propafénone, quétiapine, quinidine, ranolazine, rivaroxaban, salmétérol, sildénafil (pour traiter problèmes pulmonaires), simvastatine, ticagrélor, triazolam (par voie orale), vardénafil et vénétoclax en raison du risque d'effets indésirables sérieux.
- Apalutamide, phénobarbital, phénytoïne, rifampicine et produits contenant du millepertuis (*Hypericum perforatum*) car ils peuvent compromettre l'efficacité de Prezista^{MD} et Norvir^{MD}.

Vous devez en discuter avec votre médecin avant de les prendre. Une solution de rechange, des ajustements de doses ou un suivi pourront être suggérés si nécessaire.

- Contraceptifs oraux (pilule contraceptive) : Prezista^{MD} et Norvir^{MD} peuvent diminuer l'efficacité des contraceptifs oraux. Il est recommandé de prendre des mesures de protection supplémentaires, telles que le condom en latex.

Prezista^{MD} et Norvir^{MD} peuvent interagir avec plusieurs autres médicaments. Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un nouveau médicament sur ordonnance, un médicament en vente libre, un produit naturel ou même une drogue à usage récréatif.

Est-ce que je peux prendre de l'alcool avec Prezista^{MD} et Norvir^{MD} ?

Évitez la consommation excessive ou régulière de boissons alcoolisées (bière, vin et spiritueux) qui peut augmenter le risque d'hépatite (inflammation du foie) ou interagir avec certains de vos médicaments.

Évitez également de sauter une dose de médicament parce que vous désirez prendre une boisson alcoolisée. À moins d'avis contraire de votre médecin, une consommation raisonnable et occasionnelle d'alcool ne devrait pas nuire à votre traitement.

Afin d'éviter la transmission de l'infection dans les trois mois suivant l'exposition

- Éviter tout rapport sexuel ou utiliser des condoms;
- Éviter la grossesse, s'abstenir d'allaiter, de donner du sang, du plasma, des organes, des tissus ou du sperme.

Et en tout temps : évitez de partager des seringues.

Mode de conservation

Conservez les comprimés de Prezista^{MD} et Norvir^{MD} dans un endroit sec à température ambiante entre 15 et 30°C (59 et 86°F.).

Gardez ce médicament dans un contenant qui ferme bien. Tenez hors de portée et hors de vue des enfants.

Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe soignante afin qu'ils puissent suivre étroitement votre état de santé.