GUIDE THÉRAPEUTIQUE VIH / VHC

ANTIRÉTROVIRAUX CONTRE LE VIH

SUNLENCA[MD]

(Lénacapavir)

Suspension injectable à libération prolongée (463,5 mg/1,5 mL)

Comment ce médicament agit-il ?

Sunlenca[MD] est un antirétroviral, le lénacapavir, qui agit en empêchant la multiplication du virus de l'immunodéficience humaine (VIH).

Le lénacapavir fait partie d'une classe de médicaments appelée les inhibiteurs sélectifs de la fonction de la capside du VIH. Il agit en se liant au VIH et en l'empêchant, à plusieurs étapes de son cycle biologique, de se répliquer dans l'organisme. Ainsi Sunlenca[MD], lorsque reçu fidèlement, maintient la charge virale indétectable et permet de rester en santé.

I = I

En présence d'une charge indétectable, vous ne risquez pas de transmettre le VIH. Indétectable = Intransmissible (I = I). Par contre, en présence d'une charge virale détectable, vous risquez toujours de transmettre le VIH, soit par contact sexuel ou par le sang. Vous devez donc prendre les précautions nécessaires (utilisation du condom en latex, de seringues propres, etc.).

Comment prendre ce médicament ?

Sunlenca[MD] doit être pris en association avec d'autres antirétroviraux. Il sera administré par votre professionnel de la santé en deux injections dans l'abdomen.

Avant de débuter les injections de Sunlenca[MD], un traitement préliminaire par voie orale de **2 comprimés** (600 mg) à prendre par la bouche aux **jours 1 et 2** du traitement, suivis par **1 comprimé** (300 mg) à prendre par la bouche au **jour 8**. Vous pouvez prendre les comprimés de Sunlenca[MD] **avec ou sans nourriture**.

Sunlenca[MD] → Premières injections données **au jour 15** du traitement, ensuite **tous les 6 mois (26 semaines)** à compter de la date de la dernière injection (+/- 2 semaines).

Assurez-vous de rester sous les soins d'un professionnel de la santé pendant le traitement par Sunlenca[MD]. Il est important de vous présenter aux rendez-vous prévus pour recevoir les injections et faire le suivi de votre charge virale.

Est-ce que je peux recevoir Sunlenca[MD] avec mes autres médicaments?

Les médicaments suivants sont contre-indiqués et ne doivent pas être pris avec Sunlenca[MD] :

- Carbamazépine ou phénytoïne pour prévenir les convulsions.
- Rifampicine ou rifapentine pour traiter certaines infections bactériennes comme la tuberculose.
- Produits naturels contenant du millepertuis pour traiter la dépression et l'anxiété.

Les médicaments suivants pourraient aussi interagir avec Sunlenca[MD] :

- Oxcarbazépine ou phénobarbital pour prévenir les convulsions.
- Rifabutine pour traiter certaines infections bactériennes comme la tuberculose.
- Dihydroergotamine, ergotamine ou méthylergonovine pour traiter la migraine.
- Sildénafil, tadalafil ou vardénafil pour traiter l'impuissance ou l'hypertension pulmonaire.
- Lovastatine ou simvastatine pour abaisser les taux de cholestérol.
- Dexaméthasone (à fortes doses ou pendant plus de 10 jours) ou cortisone pour traiter l'inflammation et les réactions allergiques.
- Rivaroxaban, bétrixaban, apixaban, dabigatran ou édoxaban pour prévenir les caillots sanguins.
- Digoxine pour le rythme ou l'insuffisance cardiaque.
- Midazolam ou triazolam pour favoriser le sommeil.

Vous devez en discuter avec votre médecin avant de prendre ces médicaments. Une solution de rechange, des ajustements de doses ou un suivi plus étroit vous seront proposés si nécessaire.

D'autres médicaments ou produits pourraient interagir avec Sunlenca[MD]. Consultez votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre un nouveau médicament sur ordonnance (prescription), un médicament en vente libre, un produit naturel ou même une drogue à usage récréatif.

Quels sont les effets indésirables de ce médicament ?

Les effets secondaires les plus fréquents sont les nausées (mal de cœur) et les réactions au point d'injection (incluant de la douleur et des réactions inflammatoires comme une rougeur, une enflure et des démangeaisons). Ces effets sont habituellement d'intensité légère mais peuvent être plus importants pour certains individus.

Avisez votre médecin et votre pharmacien de tout effet indésirable qui vous incommode ou de symptôme non mentionné dans le présent document ou aggravation d'un symptôme vous empêchant de vaquer à vos occupations quotidiennes. Ils pourront vous conseiller afin de les gérer.

Suivi médical : Par des prises de sang régulières et autres tests si nécessaire, votre médecin surveillera les effets du médicament sur votre système.

J'ai oublié une dose de comprimés !

Dose prévue au jour 2 (2 comprimés)



Si moins de 6 jours depuis l'oubli : Prendre 2 comprimés dès que possible, et 1 comprimé le **jour 8**.

Si 6 jours ou plus depuis l'oubli : Prendre 2 comprimés dès que possible, et 1 comprimé le **jour 15**.

Dose prévue au jour 8 (1 comprimé)

Si moins de 6 jours depuis l'oubli : Prendre 1 comprimé dès que possible, et 1 comprimé le **jour 15**.

Si 6 jours ou plus depuis l'oubli : Prendre 1 comprimé le **jour 15**.

J'ai omis une injection !

Si vous devez sauter, ou avez sauté, une injection :

Dites-le dès que possible à votre médecin ou à votre professionnel de la santé.

Si plus de **28 semaines** (26 semaines + une fenêtre de 2 semaines) se sont écoulées depuis la dernière injection et s'il est cliniquement approprié de poursuivre le traitement, votre professionnel de la santé va vous recommander de reprendre le schéma posologique de Sunlenca[MD] à partir du **jour 1** (Prise de comprimés suivi des injections).

Ne changez pas votre schéma d'administration sans en discuter avec votre professionnel de la santé.

Grossesse et allaitement

Discutez-en avec votre médecin si vous voulez recevoir Sunlenca[MD] et que vous êtes enceinte ou désirez l'être.

Le virus peut être transmis par le lait maternel. À moins d'avis contraire de votre médecin, l'allaitement n'est donc pas recommandé chez la femme infectée par le VIH.

Est-ce que je peux prendre de l'alcool avec Sunlenca[MD] ?

Évitez de sauter une dose parce que vous désirez prendre une boisson alcoolisée. Privilégiez une consommation modérée.

À moins d'avis contraire de votre médecin, une consommation raisonnable et occasionnelle d'alcool ne devrait pas nuire à l'efficacité ou à la tolérance de votre médicament.

Mode de conservation

Conservez Sunlenca[MD] en comprimés ou en suspension injectable à une température ambiante maximale de 30°C et à l'abris de la lumière.

Gardez ce médicament hors de portée et hors de vue des enfants.

Conseils généraux

Soyez fidèle à vos rendez-vous avec le médecin et l'équipe traitante; ils pourront ainsi suivre étroitement votre état de santé.

Si vous avez des questions à propos de vos médicaments ou si vous désirez de l'aide afin de planifier la prise de vos médicaments, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin ou à votre pharmacien qui connait bien votre médication.

Personne ressource : _____

Téléphone : _____

© Juin 2026 R. Therrien